

AVANCEMENT DES STADES

Ces deux dernières semaines ont été marquées par des nuits et des matinées plus fraîches, ce qui a eu pour effet de ralentir l'avancement de la végétation. Toutefois, les températures plus douces observées l'après-midi ont permis de maintenir une dynamique d'évolution, sans pour autant provoquer de blocage du développement.

Ainsi, la reprise végétative se poursuit de manière progressive sur l'ensemble du vignoble, avec une hétérogénéité toujours marquée selon les secteurs, les cépages et les expositions.

A ce jour, le stade pointe rouge est très largement observé sur les chardonnays précoces, avec certaines parcelles atteignant déjà le stade pointe verte. Pour les pinots noirs, nous sommes plutôt sur un stade bourgeon dans le coton à début de pointe rouge.

La somme des températures en base 10 atteint désormais 13 à 25°C selon les secteurs. A titre indicatif, la somme théorique nécessaire au débourrement du Chardonnay est généralement observée autour de 35 à 40 °C cumulés, et celui du Pinot noir à partir d'environ 50 °C. Cette valeur reste toutefois à interpréter avec prudence, car elle dépend fortement de nombreux facteurs tels que la vigueur de la vigne, la date et la nature de la taille, ainsi que l'exposition au vent et au soleil.


Le cumul thermique reste ainsi cohérent avec les observations de terrain, dans un contexte où les conditions des prochaines semaines seront déterminantes pour la suite de l'évolution végétative.

Stade avancé



EXTRACTION DU 1^{ER} MARS AU 23 MARS 2026 STATION BEAUNE

• Température [°C]			• Pluie (mm)
Moy	Min	Max	Cumul
9.53	0.8	19.6	27.4



MANGE BOURGEON

Avec l'évolution des stades végétatifs, la période de sensibilité vis-à-vis des mange-bourgeons est maintenant bien engagée. Le risque débute généralement à partir du stade bourgeon dans le coton et peut se poursuivre jusqu'au débourrement.

Les températures froides observées ces derniers temps ralentissent l'évolution de la végétation et prolongent ainsi les bourgeons dans leur stade de sensibilité à la prédation.

Depuis la mi-février, la présence de noctuelles et de boarmies est signalée dans certains secteurs. Les dégâts sont régulièrement observés entre 1 et 10 %, avec dans les cas les plus extrêmes des niveaux pouvant atteindre 30 %.

D'autres chenilles font également leur apparition, notamment les écailles de martre. Plus grosses, elles restent nuisibles jusqu'au stade trois feuilles étalées et peuvent consommer jusqu'à 10 bourgeons par jour !

Les dégâts peuvent passer inaperçus et entraîner des pertes de récolte dites « sourdes » : la bourre principale est consommée, puis la bourre secondaire prend le relais, avec un potentiel de fertilité souvent plus faible.

Le seuil d'intervention est généralement atteint lorsque 15 % des ceps présentent au moins un bourgeon consommé. Une surveillance régulière des parcelles reste donc nécessaire.



Boarmie



Ecaille de Martre



Noctuelle

Nom Commercial	Dose /ha	DRE	DAR	ZNT	ZNTT	DVP	Nombre max d'applications	Form	Pictogramme de danger		UAB	Phrases de risques mélanges
Decis Protech	0,5 l	6 h	14j	20 m	5 m	/	3 trait./ha/an	EW			/	Spe8
XenTari	1 kg	24 h	3j	5 m	/	/	6 trait./ha/an (2/génération)	WG			UAB	/
Sucess 4	0.1 l	6 h	14 j	20 m	5 m	/	3 trait./ha/an (intervalle 10j)	SC			UAB	Spe8
Dipel DF	1 kg	6 h	3 j	5 m	/	/	6 trait./ha/an (2/ génération)	WG			UAB	/

Produits disponibles
à la vente !

CONFUSION SEXUELLE

La pose des diffuseurs type Puffer aura lieu le jeudi 9 avril au matin sur la commune de Vosne-Romanée.

Pour rappel, le principe de la confusion sexuelle consiste à diffuser des phéromones dans la parcelle afin de perturber la rencontre entre mâles et femelles de tordeuses de la grappe, et ainsi limiter les accouplements et les pontes.

La mise en place doit être réalisée avant le début des vols pour garantir la bonne efficacité du dispositif. Pour être performante, cette technique nécessite un minimum de 4 hectares d'un seul tenant. La pose des racks ou tout autre système de confusion sexuelle est à positionner sur la même période.



Puffer

RISQUE GEL

On distingue principalement trois types de gel. Le gel radiatif est le plus fréquent au printemps : il se produit lors de nuits calmes et dégagées, avec une perte de chaleur du sol et une accumulation d'air froid dans les zones basses.

Le gel advectif correspond à l'arrivée d'une masse d'air froid, souvent accompagnée de vent, ce qui rend la lutte plus difficile.

Le gel par évaporation peut se produire lorsqu'un air sec favorise l'évaporation de l'eau présente sur le sol ou la végétation, ce qui accentue le refroidissement des tissus.

Dans certains secteurs, les premiers dégâts de gel ont déjà été constatés sur les bourres les plus avancées. Les capteurs gel permettent de mesurer au plus près du bourgeon la température sèche et la température humide, afin d'anticiper le déclenchement des moyens de lutte. Les bougies sont surtout efficaces en situation de gel radiatif et leur efficacité diminue en présence de vent.

MUNIOdis
PROTECTION GEL

Produit disponible
à la vente !

Découvrez **MUNIOdis**, notre nouvelle solution pour protéger vos vignes contre le gel.

"MUNIOdis est une solution novatrice, à la fois simple, efficace et respectueuse de l'environnement, pour préserver la végétation.

En optant pour MUNIOdis, vous assurez à vos cultures une protection optimale contre les ravages du gel durant le printemps, dès les premières vagues de froid. Grâce à sa formule biologique, vous veillez à la santé de vos plantes tout en préservant la nature qui les entoure."



EXCLUSIVITÉ BVDIS




ABAC du nombre de bougies à l'hectare en fonction des températures

Température en dessous de 0°C	-2°C	-3°C	-4°C	-5°C à -6°C	-6°C à -7°C
Nombre de bougies nécessaire à l'hectare	200	250 à 300	300 à 350	350 à 400	400 à 500

Sous réserve de la disponibilité des stocks BVS

MÉTÉO & VITICULTURE CONNECTÉE



BVS vous propose un **service météo connecté et simple d'utilisation**, grâce à nos **65 capteurs** répartis en côte de Nuits, côte de Beaune et côte chalonaise :

- Gagnez du temps
- Optimisez vos traitements
- Prévenez les dégâts liés au gel

Disponible sur PC et smartphone



STATIONS MÉTÉO

Depuis quelques années maintenant, BVS vous propose d'adhérer au réseau de nos stations météo installées sur l'ensemble du vignoble.

Depuis votre ordinateur ou votre smartphone, cela vous permet de :

- Accéder à l'historique des données météo collectées par les différentes stations
- Planifier vos traitements en fonction des prévisions météo
- Accéder à une météo détaillée à 14 jours
- De vous créer des alertes personnalisées (pluviométrie, températures...)

Ce réseau s'enrichit d'année en année, autant en stations qu'en services.

Vous aimeriez faire un test ?

- Rapprochez-vous de votre technicien BVS qui vous fera profiter du mode démo de l'application !



CAPTEURS GEL

Afin de faciliter les mises en œuvre de moyens de lutte contre le gel, nous vous proposons des capteurs gel. Ceux-ci devront être positionnés dans les parcelles à protéger.

⇒ **Contactez votre interlocuteur BVS pour plus de renseignements !**

DES DONNÉES MESURÉES ET NON CALCULÉES

- Température sèche sans abri qui mesure la température réellement ressentie par le bourgeon (rayonnement, effet du vent...)
- Température humide sans abri qui mesure la température ressentie en cas de forte hygrométrie
- Augmentation de la fréquence d'émission quand la température humide passe en-dessous de 10°C (toutes les 11 min. contre toutes les 15 min. initialement)
- Système d'attache multi-support pour installer le capteur au plus près des bourgeons les plus sensibles
- Compatible avec tous les moyens de lutte contre le gel (aspersion, chauffage, brassage d'air)

⇒ Alerte téléphonique 24H/24

De jour comme de nuit, recevez une alerte en cas de risque de gel sur votre parcelle !

L'ÉQUIPE B.V.S.

Bulletin de situation rédigé à partir des observations hebdomadaires réalisées sur le réseau de parcelles BSV Bourgogne : le bulletin est consultable sur le site de la Chambre Régionale <https://bourgognefranche-comte.chambres-agriculture.fr>. Ces informations sont complétées par les observations quotidiennes de nos techniciens et l'outil de modélisation *AGRIGENIUS*. Avant toute utilisation de produits phytosanitaires, consultez les étiquettes regroupant toutes les informations nécessaires : homologations, doses, ZNT, DAR, DRE... Ces informations sont également disponibles dans le guide vigne de BVS "Gamme PROTECTION édition 2026" et sur le site du gouvernement <https://ephy.anses.fr>. Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur le site www.quickfds.com/fr. Les emballages vides sont collectés sur les différents sites de BVS durant la période d'utilisation. Les PPN (Produits Phytos Non Utilisables) sont collectés à des dates et des lieux bien précis (collecte ADIVALOR).

BOURGOGNE VITI SERVICE - S.A.S. au capital de 94 487,90€ - RCS DIJON B 333 583 953. Crédits photos : Bourgogne Viti Service.

BOURGOGNE VITI SERVICE, votre partenaire au quotidien.

✉ contact@bvs-viti.fr www.bvs-viti.fr

Vos magasins BVS : Nuits-Saint-Georges ☎ 03 80 61 02 13 – Beaune ☎ 03 80 22 22 50 – Chassey-Le-Camp ☎ 03 85 94 70 16 – Mercurey ☎ 03 85 45 23 70