

MÉTÉO

Résumé de la semaine passée

La semaine a débuté sous des températures relativement fraîches avant de connaître une remontée progressive. On a ainsi observé une forte amplitude thermique, avec des valeurs comprises entre 8°C et 36°C. Un épisode orageux a concerné une partie du vignoble dans la soirée du 13 juillet, occasionnant des précipitations faibles et localisées. Les cumuls relevés varient de 0 à 13 mm, avec des quantités un peu plus marquées sur le secteur de Beaune (10 à 22 mm).

Prévisions à 8 jours



Ensoleillée avec des précipitations orageuses pour ce week-end



Min : 10 °C
Max : 33 °C




7 mm annoncés



Vent 5 à 15 km/h en moyenne

Extraction du 8 au 15 juillet 2025 - Station météo de Beaune



Température (°C)			Pluie (mm)
Moy	Min	Max	Cumul
21.6	9.2	33.1	10.8

Millésime 2025

Le rythme de développement reste soutenu grâce aux quelques millimètres d'eau tombés en fin de semaine dernière. Aucun signe de blocage n'est observé pour l'heure sur vignes adultes, cependant sur jeunes plants les premiers symptômes liés à la sécheresse apparaissent. À suivre...

Les stades varient selon les secteurs : les parcelles les plus tardives atteignent le stade fermeture de grappe, tandis que le stade moyen se situe autour de fermeture +16 jours. Sur les secteurs les plus précoces, on observe les premières baies en cours de véraison, estimées à environ 20%.



Classement des millésimes selon leur date de vendanges

Cette frise classe les millésimes récents en fonction de leur date effective de vendanges, des années les plus tardives (à gauche) aux plus précoces (à droite).

Le millésime 2025 y est positionné de manière indicative en fonction de son niveau d'avancement à date, comparé aux autres années au même moment de la saison. Ce repère permet d'estimer sa précocité actuelle, sans préjuger de sa date de récolte finale.

MILDIU

Nos observations


La situation sur feuille reste globalement stable avec quelques nouvelles sorties de taches, mais en quantité limitée. En revanche, les symptômes sur grappes tendent à se multiplier dans les parcelles humides ou à végétation dense. Ces conditions favorisent la persistance du champignon et compliquent la protection.

Estimation du risque

Pour les parcelles restées saines jusqu'à présent, le risque s'amenuise progressivement avec l'avancée des stades. En revanche, dans les parcelles déjà touchées, la maladie reste active et peut encore occasionner des dégâts sur grappes, en particulier dans les zones humides ou à forte vigueur. Une vigilance particulière est de mise si le week-end et la semaine à venir s'avèrent pluvieux.

Rappel important : préserver un feuillage sain reste essentiel pour assurer une maturation correcte des raisins ainsi qu'une bonne mise en réserve pour la campagne suivante.

Incubation et apparition des symptômes



Extraction de l'OAD AgriGenius de la cinétique Mildiou

Produits disponibles à la vente chez BVS

Nom Commercial	Dose/ha	DRE	DAR	ZNT	Nombre max d'applications	UAB	BBCH
Héliocuvire (pack cerelio)	3 l	24 h	21 j	5 m	5/an	UAB	/
Bouillie Bord. RSR disp	3,75 kg	24 h	14 j	5 m	5/an	UAB	/
Cuproxat SC	3,95 l	6 h	21 j	20 m	5/an	UAB	/
Champ Flo Ampli	2 l	24 h	21 j	5 m	12/an	UAB	/
Kocide Flow	2,5 l	24 h	21 j	20 m	4/an	UAB	/
Maniflow	6 l	6 h	21 j	20 m	5/an	UAB	/
Amaline Flow	2.8 l	24h	28 j	20 m	2/an 8-12 j entre 2 appli.	/	/

Les spécialités dites de « biocontrôles » seront toujours à utiliser en association avec d'autres fongicides homologués, ne jamais les utiliser seules.

MÉTHODE(S) ALTERNATIVE(S) :

Les méthodes alternatives (épamprage) sont consultables sur le site [Ecophytopic](https://ecophytopic.com) (Source BSV)

OIDIUM

Nos observations

Peu de nouveaux symptômes sont observés sur feuilles cette semaine. En revanche, on note une augmentation des signalements sur grappes, notamment dans les secteurs à fort historique ou sur des parcelles peu aérées. Ces expressions restent pour l'instant modérées mais nécessitent une surveillance renforcée.


Estimation du risque

Le risque reste présent, car l'oïdium ne progresse plus sur des baies déjà en cours de véraison, mais peut encore s'installer sur une grappe saine atteignant tout juste ce stade. Il est important de rappeler que ce champignon, bien que moins spectaculaire que le mildiou sur le feuillage, reste un parasite actif vivant au dépend de la plante. Il fragilise les grappes et peut compromettre la qualité de la vendange, en particulier dans les secteurs encore sensibles. Il est important de poursuivre la surveillance, en particulier dans les zones à feuillages denses.




Oïdium sur grappe

Pression de la maladie sur grappes



Pression de la maladie sur les feuilles



Extraction de l'OAD AgriGenius de la cinétique Oïdium sur grappes et sur feuilles

Produits disponibles à la vente chez BVS

Nom Commercial	Dose/ha	DRE	DAR	ZNT	Nombre max d'applications	UAB	BBCH
Soufle sublimé Afepasa	25 kg	24 h	5 j	5 m	8/an	UAB	15-...
Microthiol Special Disperss	12,5 kg	6 h	3 j	5 m	8/an	UAB	/
Thiopron Rainfree	12.1 l	48h	3 j	5 m	8/an	UAB	/
Héliosoufre S	7,5 l	24 h	5 j	5 m	12/an	UAB	/
Hoggar	0,6 l	48 h	35 j	20 m	3/an	/	/
Armicarb	3 kg dose préc	6 h	1 j	5 m	8/an	UAB	/
Vitisan	4 kg dose préc	6 h	1 j	5 m	6/an 3 j entre 2 appli.	UAB	12-89

MÉTHODE(S) ALTERNATIVE(S) :

Les méthodes alternatives (épamprage) sont consultables sur le site [Ecophytopic](https://ecophytopic.fr) (Source BSV)


VERS DE LA GRAPPE

Nos observations

Le vol de deuxième génération touche progressivement à sa fin. On observe une nette chute des captures dans les pièges ces derniers jours.

Estimation du risque

Une surveillance reste à maintenir dans les secteurs à fort historique, même si l'activité des papillons est en net repli. À ce stade de développement, les baies commencent à se charger en sucres, et toute perforation liée aux vers de la grappe peut constituer une porte d'entrée pour le botrytis. La vigilance est donc de mise, notamment dans les situations déjà fragilisées.



STRESS HYDRIQUE ET THERMIQUE

Avec l'arrivée au stade de fermeture de grappe, la vigne est dans une phase de forte sensibilité aux dégâts d'échaudage et de grillure. Ce stade, critique en matière d'intégrité des baies, coïncide malheureusement avec des conditions météorologiques extrêmes.

Jusqu'à présent, les réserves hydriques des sols permettaient à la vigne de limiter les effets du stress, mais certaines parcelles commencent à montrer des signes d'épuisement en eau disponible, en particulier sur les sols superficiels ou filtrants. Cette baisse des réserves amplifie la vulnérabilité des baies, notamment lors d'épisodes de températures élevées combinées à des hygrométries très basses, parfois inférieures à 20%.

Attention également aux traitements phytosanitaires, en particulier ceux à base de soufre : en conditions chaudes, ils peuvent entraîner des brûlures sur feuilles et sur raisins. Il est fortement recommandé de limiter les applications après 9h du matin les jours de forte chaleur, et de privilégier les interventions en début de matinée ou en soirée, avec un matériel bien réglé.



Début de phytotoxicité sur feuilles et sur grappes

Les fortes chaleurs estivales font planer un risque accru d'échaudage et de stress hydrique, avec des conséquences directes sur le rendement, la qualité des baies et l'équilibre des moûts. Les premiers symptômes sur plantations sont désormais visibles.

L'exposition prolongée des grappes à de fortes températures, surtout en conditions sèches, peut entraîner la grillure des baies : flétrissement partiel ou total, baies brûlées ou déshydratées. En Bourgogne, ces phénomènes peuvent faire perdre jusqu'à 15 à 30% de récolte sur les parcelles les plus exposées (coteaux secs, expositions sud, sols superficiels), et jusqu'à 40 % en cas de coup de chaud intense à la véraison.

Au-delà du volume, c'est l'équilibre des moûts qui est affecté : la maturité technologique (sucres) devance souvent la maturité phénolique (tanins, arômes), générant des vins trop alcooleux et déséquilibrés, en décalage avec les attentes actuelles.

Enfin, un stress hydrique intense peut provoquer un blocage de la maturité, une réduction du poids des baies, voire une chute prématurée du feuillage, altérant la qualité de la récolte et du vin.

Les barrières physiques comme *Calshield* ou *Invelop White Protect*, appliquées en surface, peuvent être complétées par des osmoprotecteurs tels que *Lalstim Osmo* (protection cellulaire interne). Ces solutions doivent cependant être mises en place de façon préventive, avant l'apparition des premiers dégâts liés aux coups de chaud.



CALSHIELD

600 g/l Carbonate de calcium

Barrière physique, réduction échaudage grillure, réduction de la température sur grappes et feuillage

Dose recommandée 10 l/ha

BARRIERE PHYSIQUE



INVELOP WHITE PROTECT

Talc qualité alimentaire

Barrière physique, réduction échaudage grillure, réduction de la température sur grappes et feuillage, réduction de l'humectation

Dose recommandée 5 à 20 kg/ha
(max 10% de la bouillie)

OSMOPROTECTEUR



LALSTIM OSMO

970 g/kg Glycine bêtaïne

Meilleure gestion de l'eau par la plante, limite le flétrissement des baies, limite les écarts entre maturité phénolique et technologique

Dose recommandée 2 kg/ha
toutes les 3 semaines

APPORT FOLIAIRE

Les premiers signes de carences commencent à apparaître dans certaines parcelles, notamment en potasse et en magnésium. Ces déficiences peuvent compromettre la qualité de la maturation et fragiliser la plante face aux stress abiotiques ou pathogènes.

La carence en potasse se manifeste généralement par un jaunissement des bords des feuilles, suivi d'une nécrose marginale, notamment sur les vieilles feuilles. Elle peut impacter la fermeté des baies et la régulation hydrique.

La carence en magnésium apparaît quant à elle sous forme de décolorations internervaires sur les feuilles, souvent au niveau des étages moyens. Les nervures restent vertes tandis que les tissus entre-elles jaunissent pour cépages blancs, avec parfois des plages rougeâtres sur cépages rouges. Cela peut affecter la photosynthèse et ralentir la maturation.

Une surveillance fine est recommandée pour identifier rapidement ces symptômes et adapter si nécessaire la stratégie de fertilisation foliaire.

Carence Magnésienne →



← Carence Potassique



SEACTIV MAGICAL

16.6 g/l Calcium

5.5 g/l Magnésium

Oligo-éléments

Dose recommandée 4 l/ha



NUTRIBIO Mg

90 g/l Magnésie

180 g/l Anhydrique sulfurique

Dose recommandée 3 à 5 l/ha



NUTRIKALI

40 g/l azote (acides aminés)

70 g/l potassium

+ oligo-éléments naturels

Dose recommandée 3 à 5 l/ha en encadrement de fleur



PLANTIGEL

30 g/l Azote organique

40 g/l Potassium

Dose recommandée 2 à 5 l/ha



L'ÉQUIPE B.V.S.

Bulletin de situation rédigé à partir des observations hebdomadaires réalisées sur le réseau de parcelles BSV Bourgogne : le bulletin est consultable sur le site de la Chambre Régionale <https://bourgognefranche-comte.chambres-agriculture.fr>. Ces informations sont complétées par les observations quotidiennes de nos techniciens et l'outil de modélisation AGRIGENIUS. Avant toute utilisation de produits phytosanitaires, consultez les étiquettes regroupant toutes les informations nécessaires : homologations, doses, ZNT, DAR, DRE... Ces informations sont également disponibles dans le guide vigne de BVS "Gamme PROTECTION édition 2025" et sur le site du gouvernement <https://ephy.anses.fr>. Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur le site www.quickfds.com/fr. Les emballages vides sont collectés sur les différents sites de BVS durant la période d'utilisation. Les PPNV (Produits Phytosanitaires Non Utilisables) sont collectés à des dates et des lieux bien précis (collecte AIVALOR).
BOURGOGNE VITI SERVICE - S.A.S. au capital de 94 487,90€ - RCS DIJON B 333 583 953. Crédits photos : Adobe Stock, Bourgogne Viti Service.

BOURGOGNE VITI SERVICE, votre partenaire au quotidien.


contact@bvs-viti.fr
www.bvs-viti.fr

Vos magasins BVS : Nuits-Saint-Georges ☎ 03 80 61 02 13 – Beaune ☎ 03 80 22 22 50 – Chassey-Le-Camp ☎ 03 85 94 70 16 – Mercurey ☎ 03 85 45 23 70